

SZCZEPIENIA DODATKOWE / ZALECANE WYKONYWANE W
C.U.M. „PROXIMUM” Sp. z o.o.

lp	Rodzaj szczepionki	Przeznaczenie
1.	Engerix 20 mcg	Szczepionka przeciwko WZW typu B (HBV)
2.	Euvax	Szczepionka przeciwko WZW typu B (HBV)
3.	HBVAX PRO (WZW –B)	Szczepionka przeciwko WZW typu B (HBV)
4.	HAVRIX ADULT	Szczepionka przeciwko WZW typu A – zalecana dla dorosłych
5.	HAVRIX JUNIOR	Szczepionka przeciwko WZW typu A – zalecana dla dzieci od 1 do 18 roku życia włącznie
6.	TWINRIX ADULT	Szczepionka przeciwko WZW typu A i typu B - do uodparniania wcześniej nieuodpornionych dorosłych i młodzieży zalecana od 16 roku życia włącznie
7.	PRIORIX	Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce
8.	MMR II	Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce dla dorosłych
9.	INFANRIX – IPV - HIB	- Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus influenzae typu b zalecana dla dzieci od 2 miesiąca życia - Szczepionka zalecana jako uzupełniająca u dzieci uprzednio uodpornianych DTP, polio i antygenami Hib.
10.	INFANRIX HEXA	Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis (polio) i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu b przeznaczona do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci
11.	PENTAXIM	Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus influenzae typu b
12.	VARILRIX	Szczepionka przeciwko ospie wietrznej – zalecana dla osób zdrowych od 9 miesiąca życia, osób z grupy wysokiego ryzyka oraz osób zdrowych narażonych na bliski kontakt z chorymi na ospę wietrzną
13.	ROTARIX	Szczepionka przeciwko rota wirusom , doustna - w celu zapobiegania wystąpienia zapalenia żołądka i jelit (biegunką i wymiotami) wywołanego zakażeniem rota wirusem zalecana dla niemowląt w wieku od 6 tygodni
14.	ROTATEQ	Szczepionka przeciwko rota wirusom , doustna - w celu zapobiegania wystąpienia zapalenia żołądka i jelit (biegunką i wymiotami) wywołanego zakażeniem rota wirusem zalecana dla niemowląt w wieku od 6 tygodni
15.	PREVENAR	Szczepionka przeciwko pneumokokom - uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc i ostremu zapaleniu ucha środkowego wywołanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae zalecana u niemowląt, dzieci od 6 tygodnia i dorosłych
16.	NEISVAC C	Szczepionka przeciwko meningokokom - uodparnianie przeciwko zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis (dwoinkę zapalenia opon mózgowych) zalecana dla dzieci po ukończeniu 2 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych
17.	SILGARD	Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego – odpowiedzialnego za: wystąpienie dysplazji szyjki macicy dużego stopnia, raka szyjki macicy, zmian dysplastycznych sromu dużego stopnia oraz brodawek zewnętrznych narządów płciowych (kłykcin kończystych) związanych z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

18.	FSME ADULT	Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu - uodparnianie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu zalecana powyżej 16 roku życia.
19.	FSME JUNIOR	Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu - uodparnianie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dzieci pow. 1 do 16 roku życia.
20.	SYNFLORIX	Szczepionka przeciwko pneumokokom - czynnie uodparnia organ przeciwko chorobom inwazyjnym, ostremu zapaleniu ucha środkowego i zapaleniu płuc, powodowanym przez pneumokoki u dzieci od 6 tygodnia do 2 roku życia.
21.	BOOSTRIX POLIO	Szczepienie przypominające przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis zalecana od 4 roku życia.
22.	BOOSTRIX	Szczepienie przypominające przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi zalecana w wieku od 4 roku życia.
23.	ADACEL	Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi od 4 roku życia.
24.	NIMENRIX	Szczepienie przeciw meningokokom grupy A,C,W,Y zalecana od 7 tygodnia życia
25.	BEXSERO	Szczepionka przeciwko meningokokom grupy B dla dzieci powyżej 2 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych
26.	HEXACIMA	Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis (polio) i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu b przeznaczona do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci
27.	TYPHIM	Szczepionka zalecana w celu zapobiegania zakażeniu durem brzuszny u osób dorosłych i dzieci powyżej 2 r.ż., udających się w rejony endemiczne oraz u osób, którym nie można podać szczepionki pełnokomórkowej
28.	Td	Szczepienie w celu uodpornienia przeciwko tężcowi i błonicy
29.	IMOVAX POLIO	Szczepionka przeciwko poliomyelitis , inaktywowana, stosowana u niemowląt, dzieci i dorosłych w szczepieniu podstawowym oraz jako dawka przypominająca
30.	HEPAVAX-GENE TF-1	Szczepionka przeciwko WZW typu B (HBV)